

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
(ภารกิจให้บริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

โรงพยาบาลตะโหนด
อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษา
โรงพยาบาลตะโหนด อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง

1

รับบัตรคิวที่จุดคัดแยกประเภทผู้ป่วย
(หน้าห้องเวชระเบียน)



2

ยื่นบัตรคิว พร้อมด้วยบัตรประชาชนและ
บัตรโรงพยาบาล / บัตรทอง



3

ซักประวัติเบื้องต้นก่อนพบแพทย์
หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก



4


พบแพทย์ - ส่งชั้นสูตรเพิ่มเติม



5

รับยา / กลับบ้าน

แนวทาง/ขั้นตอนการรับบริการในคลินิกDM/HTโรงพยาบาลตะโหนด
ปรับครั้งที่ 3 (24 มิ.ย.62)



เกณฑ์ปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยเรื้อรังAdmit

1.ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

1.1 เจ้าหน้าที่Ward โทรแจ้ง NCM /นักโภชนาการ

1.2 NCM ประเมินปัญหาผู้ป่วย

1.3 ร่วมกันวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

- แพทย์

- เภสัชกร

- พยาบาลในคลินิก NCD

- นักโภชนาการ

- นักกายภาพ

- ทีมสุขภาพจิต

- ศูนย์เยี่ยมบ้าน

1.4 วางแผนติดตามเยี่ยมหลัง D/C ภายใน 2 สัปดาห์ วัน พุธ - พฤหัสบดี

1.5 ติดตามเยี่ยมร่วมด้วยทีมเยี่ยมและจนท.ในพื้นที่ รพ.สต.

2.ผู้ป่วย COPD/Asthma

2.1 เจ้าหน้าที่Ward โทรแจ้ง ทีมคลินิก NCD

2.2 ร่วมกันวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

- แพทย์

- เภสัชกร

- พยาบาลในคลินิก

- นักกายภาพ

- ทีมสุขภาพจิต

- ศูนย์เยี่ยมบ้าน

2.3 วางแผนติดตามเยี่ยมหลัง D/C ภายใน 2 สัปดาห์ วัน พุธ - พฤหัสบดี



2.4 ติดตามเยี่ยมร่วมด้วยทีมเยี่ยมและจนท.ในพื้นที่ รพ.สต.

หลักเกณฑ์ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการเยี่ยมบ้าน/ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

1. ผู้ป่วยเรื้อรังขาดนัด เกิน 2 visit
 2. ผู้ป่วยเรื้อรังเบาหวานที่ควบคุมภาวะน้ำตาลไม่ได้
 - ผู้ป่วยที่มีผล FBS/DTX \geq 300 mg% เมื่อรับยา
 - ผู้ป่วย On Insulin ที่มีภาวะ Hypo/Hyper บ่อยๆ
 3. ผู้ป่วยเรื้อรังที่ Re – admit
 - ผู้ป่วย COPD/Asthma Re – admit ภายใน 28 วัน
 - ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันฯ ที่ admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
 4. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (มีค่า GFR \leq 40)
 5. ผู้ป่วย Asthma/COPD ที่มีภาวะ attack ที่ ER > 2 ครั้ง/เดือน
 6. ผู้ป่วยรายกรณีเฉพาะที่มีการ Request จากทีมสหวิชาชีพ เช่น
 - มีโรคร่วมและไม่สามารถมารพ.เองได้
-

แนวทางการคัดกรอง และการวินิจฉัยความดันโลหิตสูง ใน รพ.สต./PCU

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 2560
 อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับเบาหวาน ปี 2560
 ลงชื่อ (พญ.สุชาดา อายารัตนศิลป์)
 ประธาน ทีม NCD board



แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน CUP 60

DM Screening

- อายุ ≥ 35 ปี
- มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน รอบเอว $\geq 1/2$ ของส่วนสูง (ชาย) หรือ BMI ≥ 25 กก/ม² และมีพ้อมันที่หรือบ่งชี้เบาหวาน
- เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรหนัก > 4 กก.
- HT หรือ BP $\geq 140/90$ mmhg
- เคยได้รับการตรวจพบว่าเป็น Impaired glucose tolerance หรือ Impaired fasting glucose หรือ Pre Hypertension
- มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ หรือรับประทานยาลดไขมันอยู่
- ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด
- มีกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่ (Polycystic ovarian syndrome)
- สูบบุหรี่

FPG 100-125, 75 g glucose
FPG 140-199 เป็นกลุ่มเสี่ยง

FPG < 100

FPG ≥ 126 ตรวจ FPG 2 ครั้ง 1 ชม. สด/PCU

ทำ 75 g glucose ถ้าระดับน้ำตาลกลูโคส 2 ชั่วโมง หลังดื่ม น้ำตาล ≥ 200

@@@ ถ้ามีอาการของ DM จัดจนให้เจาะเป็น random plasma glucose ได้เลย และถ้า ≥ 200 วินิจฉัย DM

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม FU DTX 3 ครั้ง ติดตาม 3 เดือน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตรวจ FPG ทุก 1 ปี

Repeat FPG ≥ 126 สังเกตวินิจฉัย DM ใหม่ ตรวจซ้ำ FPG ≥ 126 วินิจฉัย DM ขึ้นทะเบียน new case

*** ตรวจ Lab พื้นฐาน คือ FBS, CBC Lipid profile, S-Cr., BUN eGFR, HbA1c, EKG, UA Microalbumin นัดตรวจตามค่าช่องปาก, ประเมิน CVD risk

FPG < 180 และ HbA1c < 8%

FPG ≥ 180 , A1c > 8%

FPG > 220 หรือ HbA1c > 9%

FPG > 300 หรือ HbA1c > 11% ร่วมกับมีอาการจากน้ำตาลในเลือดสูง

FPG > 300 หรือ HbA1c > 11% มีโรคหรือภาวะอื่น

ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 เดือน * เริ่มปรับลดหวานและการดูแลตนเอง ทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้** ให้เริ่มรักษาด้วยยา

ให้ Metformin (500) 1x1pc ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าควบคุมน้ำตาลไม่ได้** ให้เริ่มใช้ยา 2 ตัว

พิจารณาเริ่มด้วยยา 2 ชนิด Metformin + Glipizide

ยาเม็ด 2 ชนิด + NPH ยาฉีด mixard /RI or ส่งต่อ specialist

NPH start = 0.1 u/kg/day, Max = 0.6 u/kg/day

HbA1c < 7 ตรวจซ้ำ ภายใน 1 ปี
HbA1c ≥ 7 ตรวจซ้ำ พิจารณา จนพบในทันที

*** ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม**

- กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
- บริโภคอาหารตามหลักสุขภาพ
- ดนุบุรี
- ดุนมาหนัก

ลดอุบัติการณ์เบาหวานได้ 40-60%

*** ถ้าผู้ป่วย DM ตั้งครรภ์ให้ off ยา กิน และให้ยาลด insulin แทน

**** ยา 2 ตัวต้องออกฤทธิ์ต่างกัน - ควรรับประทานที่ 2 เมื่อได้ยาชนิดแรก ในขนาด $1/2 - 2/3$ ของขนาดสูงสุด แล้วจึงเพิ่มน้ำตาลไม่ได้

**** เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน**

| | | | |
|-------|--------|--------|-----------|
| FPG | 70-110 | 80-130 | 140-170 |
| HbA1c | < 6.5 | < 7.0 | 7.0 - 8.0 |

- อายุย่อย
- เป็นไม่นาน
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

- สูงอายุที่สุด
- ตัวเองไม่ได้
- ผู้ป่วย CAD
- CHF, CVA, 3ก, โรคตับ, โรคไตระยะสุดท้าย

*** ถ้าอายุเริ่มด้วย Metformin ไม่อย่าง พิจารณาเริ่มด้วย glipizide หรือ glibenclamide.

คำระวัง !! อาการของหัวใจขาดเลือด

ระยะเตือนพ่น

1. เจ็บหน้าอกครั้งใดก็ได้จากออกจนถึงคอ และอาจเจ็บร้าวไปที่คอ คาง หิน ไหล่ หรือแขนข้างใดข้างหนึ่ง หรือ 2 ข้าง อาการร่วม คือ เหงื่อแตก ใจสั่น ตื่นไม่หลับ อ่อนเพลีย
2. ลักษณะอาการเจ็บเจ็บแน่นๆ เจ็บรัดๆ เจ็บรุนแรงในอก
3. เจ็บขณะทำงาน, ภายหลังทานอาหาร, ภายหลังขึ้นบันได

โทรฯ รับปรึกษาแพทย์ทันทีหากมีอาการเช่นนี้
เจ็บนานประมาณ 15-30 นาที
หากพบ ส่ง ER Refer รพ. พักดูภายใน 12 ชั่วโมง

@ Glipizide max dose 20 mg/day, ไม่ปรับ dose ใน CKD, เบี่ยงยี่ห้อ, น.บ. ขึ้น, เลือกลงขนาดที่ Sulfis

@ Metformin max dose 3,000 mg/day, งด GFR < 30 of eGFR, มี GI side effect หากได้รับยาทั้ง 2 ชนิด maximum dose แล้ว ยังคุมไม่ได้ พิจารณาฉีด insulin

@ Add ASA : age ≥ 50 ปี + เสี่ยง CVD (หรือ สูบบุหรี่ หรือ DLP หรือ มี albuminuria หรือ H+V50 รับประทาน Aspirin 100 mg/day)

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2. ค.ค. 2560

อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับเบาหวานปี 2560

องช้อ

(พญ. สุวิภาดา ฉายารัตนศิลป์)
ประธานทีม NCD board

งานผู้ป่วยใน : ผู้ป่วยเบาหวาน

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานขณะรับไว้ดูแล : การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน

- เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง : โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, แผลติดเชื้อ, ตาฝ้า, โรคไต, ไขมันน้ำอึก, อ่อนแรง
1. Record V/S
 2. รักษาตามอาการ/ตามแพทย์สั่ง
 3. แนะนำญาติสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน


ภาวะ Hypoglycemia ≤ 70 mg/dl
และมึนงง
- หัวใจวายจะขาด
- ปากชา ลิ้นชา
- ใจเต้น

ภาวะ Hyperglycemia ≥ 250 mg/dl
และ มีอาการ
- อ่อนเพลีย
- คลื่นไส้ อาเจียน
- กระหายน้ำมาก
- ปัสสาวะมาก

แนวทางการ Refer ไป รพ. พัทลุง ***


1. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันรุนแรง เช่น DKA, HHC หรือ $Cr \geq 2$ mg/dl หรือ $GER < 30$ cc/min พบแพทย์เฉพาะทาง
2. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา, ไต, หลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง
3. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง (sepsis) หรือแผลเบาหวานติดเชื้อ cellulitis ที่ควบคุมไม่ได้
4. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยา insulin (ระดับน้ำตาลสูงต่ำ ไม่คงที่)

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 2560
อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับเบาหวาน ปี 2560
ลงชื่อ (พญ. สุชาดา ฉายารัตน์กิตติ์)
ประธาน ทีม NCD Board



งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน : DM

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา




มีภาวะแทรกซ้อน

ประวัติเป็น DM

เขียนพิน

มีภาวะหัวใจและหลอดเลือด,
โรคหลอดเลือดสมอง, แผลติดเชื้อ,
ตาบอด, โรคไต, จีบหน้าอก, อ่อนแรง



capillary blood glucose (CBG) Stat

รักษาตามอาการเฉพาะโรค

≤ 70 mg/dl

≥ 250 mg/dl

รูสึกตัว


รูสึกตัว

รูสึกตัว

รูสึกตัว

*ปัจจัยเสี่ยง

1. อ้วน (BMI > 25 Kg/m²)
2. ไขมันคอเลสเตอรอล เกิน (ปกติ = ไขมันสูง/2)
3. ผู้ป่วยโดยตรงเป็นเบาหวาน
4. ความดันโลหิตสูง (≥ 140/90 mmHg)
5. HDL < 35 mg/dl หรือ triglyceride ≥ 250 mg/dl
6. โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ หรือลดคอเลสเตอรอลต่ำกว่าหนักเกิน 4 kg ขึ้นไป
7. เคยตรวจพบว่า เป็น Impaired glucose tolerance หรือ Impaired fasting glucose
8. โรคของหลอดเลือดแดง



ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 2560
อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับเบาหวาน ปี 2560


ลงชื่อ

(พญ.สุรดา นายรัตนศิลป์)

ประธาน ทีม NCD board


งานห้องคลอด : DM

ผู้ป่วยเบาหวาน Admit



ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ค.ศ. 2560
อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับเบาหวาน ปี 2560
ลงชื่อ (หมอ.สุชาดา นวยรัตนศิลป์)
ประธานทีม NCD board


งานห้องคลอด/หลังคลอด : DM



ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 2560
 อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับเบาหวาน ปี 2560
 ลงชื่อ (พญ.สุชาดา นายรัตนศิลป์)
 ประธาน ทีม NCD board

แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน ผู้ป่วยนอก / รพ.สต./ PCU
 กลุ่มเป้าหมาย อายุ ≥ 35 ปี ขึ้นไป

งคน้ำ - งดอาหาร > 8 ชม. ตรวจ FPG กรณีไม่สามารถทำ FPG ได้ให้ใช้ CBG จากปลายนิ้ว



ให้คำแนะนำการดูแลเรื่องโรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 เนื้อหา - โรคเบาหวานและมีปัจจัยเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน
 - อาหาร - สดมัน - ออกกำลังกาย - งดบุหรี่(ถ้า Hx เสี่ยง)
 - ลดระดับ HbA1c (ถ้า Hx เสี่ยง) - การดูแลเท้า - การทำแผล
 - การรับประทานยา - การฉีด.อินซูลิน(กรณีรับยาฉีด)
 - เฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น เชื้อรา, วัณโรค, โรคผิวหนัง

DM screening
 1. อายุ ≥ 35 ปี
 2. BMI ≥ 25 /ญาติสายตรงเป็นเบาหวาน
 3. HT หรือ BP $\geq 140/90$ mmHg
 4. HDL < 35 mg/dl หรือ triglyceride ≥ 250 mg/dl
 5. โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4 kg ขึ้นไป
 6. เคยตรวจพบว่า เป็น Impaired glucose tolerance หรือ Impaired fasting glucose
 7. ประวัติ โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาการสงสัย DM
 1. มีสภาวะบ่อยและมาก 2. กินจุแต่ผอม 3. ดื่มน้ำบ่อยและมาก
 4. เป็นแผลเรื้อรัง 5. คันผิวหนังหรืออวัยวะเพศ
 6. ขาดสมาธิ/ง่วง โดยไม่ทราบสาเหตุ

ข้อชี้แจง DM (หน่วยเป็น คะแนน)
 1) อายุ $\rightarrow 34-39$ ปี = 0 3) BMI $\rightarrow < 23 = 0, 23-27.4 = 3, \geq 27.5 = 5$
 $\rightarrow 40-44$ ปี = 0 4) รอยโรค \rightarrow ไม่มี = 0, \rightarrow < 90 cm. อย. < 80 cm = 0, ≥ 80 cm = 2
 $\rightarrow 45-49$ ปี = 1 5) HT \rightarrow ไม่มี = 0, มี = 2
 $\rightarrow \geq 50$ ปี = 2 6) เคยมีโรคเบาหวาน \rightarrow ไม่เป็น DM = 0, เป็น DM = 4

แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน CUP ตะโหมด 60

DM Screening

- อายุ ≥ 35 ปี
- มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน รอบเอว $\geq 1/4$ ของส่วนสูง (ชม) หรือ BMI ≥ 25 กก/ม² และมีหัตถ์หรือข้อนิ้วเป็นเบาหวาน
- เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรแรก > 4 กก.
- HT หรือ BP $\geq 140/90$ mmhg

เคยได้รับการตรวจว่าเป็น Impaired glucose tolerance หรือ Impaired fasting glucose หรือ Pre Hypertension

- มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ หรือมีประวัติประวัติทางยาอดไขมันอยู่

- ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด

- มีกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่ (Polycystic ovarian syndrome)

- สูบบุหรี่

*** ถ้ามีอาการของ DM จัดงานให้เจาะเป็น random plasma glucose ได้เลย และถ้า ≥ 200 วินิจฉัย DM

FPG 100-125, ทั่ว 75 g glucose

FPG 140-199 เป็นกลุ่มเสี่ยง

FPG < 100

FPG ≥ 126 ตรวจ FPG ซ้ำใน 1 wks ที่ รพ. สด/PCU

ทำ 75 g glucose ซ้ำ ระดับพลาสมากลูโคส 2 ชั่วโมง หลังดื่ม น้ำตาล ≥ 200

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม FU DTX 3 ครั้ง ติดตาม 3 เดือน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตรวจ FPG ทุก 1 ปี

Repeat FPG ≥ 126 ส่งต่อคลินิก DM รพ.ตะโหมด ตรวจซ้ำ FPG ≥ 126 วินิจฉัย DM ซ้ำเพะเขียน new case *** ตรวจ Lab พื้นฐาน คือ FBS, CBC Lipid profile, S-Cr, BUN eGFR, HbA1c, EKG, UA Micro albumin นัดตรวจคนทำห้องฝาก, ประเมิน CVD-risk

FPG < 180 และ HbA1c < 8 %

FPG ≥ 180 , A1c > 8%

FPG > 220 หรือ HbA1c > 9 %

FPG > 300 หรือ HbA1c > 11 %

มีโรคหรือภาวะอื่น

ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 เดือน * เรียนรู้โรคเบาหวาน และการดูแลตนเอง หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้ามีระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ให้เริ่มรักษาด้วยยา

ให้ Metformin (500) Ex-lpce ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าควบคุมน้ำตาลไม่ได้** ให้เริ่มด้วย 2 ตัว

พิจารณาเริ่มด้วยยา 2 ชนิด Metformin + Glipizide

ยาเม็ด 2 ชนิด + NPH ยาฉีด mixard /RI or ส่งต่อ specialist

NPH start = 0.1 u Age/day, Max = 0.6 u Age/day

HbA1c < 7 ตรวจซ้ำ ภายใน 1 ปี

HbA1c ≥ 7 ตรวจซ้ำ ภายใน 6 เดือนโดย พิจารณา อภพ.ในพื้นที่

*** ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม**

- กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
- บริโภคอาหารตามหลักสุขภาพ
- งดบุหรี่
- งดสูบบุหรี่
- ลดจุดบริการเบาหวานได้ 40-60%

*** ถ้าผู้ป่วย DM ดังครรภิกให้ o ธิยา กิน และให้ใช้ฉีด insulin แทน

**** ยา 2 ตัว ต้องออกฤทธิ์ต่างกัน - ควรเริ่มขนาดที่ 2 เมื่อได้ยาชนิดแรก ในขนาด 1/2 - 2/3 ของขนาดสูงสุด แล้วจึงเพิ่มน้ำหนักไม่ได้

**** เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน**

| | | |
|-------|--------|-----------|
| FPG | 70-110 | 140-170 |
| HbA1c | < 6.5 | 7.0 - 8.0 |

- อายุน้อย

- เป็นไม่นาน

- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

- สูงอายุ/ดูแลตัวเองไม่ได้

- ผู้ป่วย CAD

- สูงอายุ/ดูแลตัวเองไม่ได้

- ผู้ป่วย CHF, CVA, วัณ, โรคไต, โรคไตระยะสุดท้าย

เฝ้าระวัง !! อาการของหัวใจขาดเลือด

ระยะเฉียบพลัน

ไม่เจ็บหน้าอกแต่มีคลื่นที่ได้จากขดลวดถึงคอ และอาจเจ็บร้าวไปที่คอ คาง ฟัน ไหล่ หรือแขนข้างใดข้างหนึ่ง หรือ 2 ข้าง อาการร้าย คือ เหนื่อยแตก ใจเต้น กลืนไม่ได้ อ่อนเพลีย

2. ลักษณะการเจ็บเจ็บแน่นๆ เจ็บรัดๆ เจ็บรุนแรงในอก

3. เจ็บขณะทำงาน ยกของหนัก ตื่นเต้น

โทรกร รพ.ระยอง โทร 166 หรือ โทร 112

เจ็บนานประมาณ 15 - 30 นาที

หากพบส่ง ER Refer รพ. พัทลุง ภายใน 12 ชั่วโมง

@ Glipizide max dose 20 mg/day, ไม่ปรับ dose ใน CKD, เสี่ยง Hypo, หมดชีพ, เสี่ยงในคนเบาห้ Sulfide

@ Metformin max dose 3,000 mg/day ถ้า GFR < 30 คม MMSM, มี GI side-effect หากได้รับยาทั้ง 2 กลุ่ม maximum dose แล้ว ยังคุมไม่ได้ พิจารณาฉีด Insulin

@ Add ASA : age ≥ 50 ปี + เสี่ยง CVD (สูบบุหรี่ or DLP or มี albuminuria or HT or มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว)


มีรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ค.ศ. 2560

ตั้งชื่อ

(พญ.ศุภาดา ฉายารัตนศิลป์)

ประธานทีม NCD board

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง CUP ตะใหม่ด



Follow up 2 ปีถัดมา
 ตรวจ lab พื้นฐาน
 - FBS, Lipid profile
 - Bun, SCr. (คำนวณค่า GFR if Stage 3 ปรับปรุงแผนการรักษา จัดส่งไปรีติน ลดเค็ม, if Stage 4 Refer รพ. พิษณุฯ พบอายุรแพทย์ ทุกวันศุกร์)
 ระดับค่า -GFR -GFR stage 1; > 90
 -GFR stage 2; 60 - 89 -GFR stage 3; 50-59
 -GFR stage 4; 15-29 -GFR stage 5; < 15
 - EKG
 - UA: ถ้าผล positive Repeat ภายใน 3 เดือน และถ้าผล negative ตรวจ micro Albumin ต่อ
 - lab ตาม Undercharge (เช่น Govt, Thyroid ฯลฯ)
 - ประเมินปัจจัยเสี่ยง, ฟูไซ-CV risk
 - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อาการของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

1. ชา อ่อนแรง/ขน/ขา/หน้าข้างใดข้างหนึ่งทันที
2. พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือฟังไม่เข้าใจในทันทีทันใด ชิมขมปาก
3. เดินเซ เวียนศีรษะทันที
4. ตามองเห็นภาพซ้อนหรือมีควมวิ้งข้างใดข้างหนึ่งทันที
5. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

หากพบ Refer รพ. ตะใหม่ด ทันที

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 60
 อึ้งอิงฉฉก ผนวทการรักษารักษาโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนปฏิบัติทั่วไป
 ตมคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 2558
 ลงชื่อ
 (พญ.สุชาดา ฉายรัตน์ศิริณี)
 ประธาน ทีม NCD board

ตารางให้บริการของโรงพยาบาลตะโพน

| วัน | เช้า (08.30 - 12.00 น.) | บ่าย (13.00 - 16.30 น.) |
|----------|---|--|
| จันทร์ | คลินิกศัลยกรรม คลินิกทันตกรรม (โสตศอนาสิก) คลินิก OPAC | คลินิกศัลยกรรม คลินิกฟื้นฟูผู้ป่วย (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) คลินิกการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) |
| อังคาร | คลินิกศัลยกรรม คลินิกโรคหัวใจ (CCU) คลินิกโรคไต (ผู้ป่วยที่ 1) และ 2 คลินิกโรคหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) | คลินิกศัลยกรรม คลินิกทันตกรรม |
| พุธ | คลินิกศัลยกรรม คลินิกโรคหัวใจ คลินิกสูดดมหัวใจ/ไต (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) คลินิกหัวใจปลูกถ่าย - สูด (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) | คลินิกฟื้นฟู คลินิกทันตกรรม, โสตศอนาสิกและโสตศอนาสิก |
| พฤหัสบดี | คลินิกศัลยกรรม คลินิกทันตกรรม (โสตศอนาสิก) คลินิกสูดดมหัวใจ/ไต (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) คลินิก OPAC | คลินิกทันตกรรม, โสตศอนาสิกและโสตศอนาสิก |
| ศุกร์ | คลินิกศัลยกรรม คลินิกทันตกรรม (โสตศอนาสิก) (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) คลินิก OPAC คลินิกโรคหัวใจปลูกถ่าย (ผู้ป่วยที่ 1, 2 และ 3) คลินิกโรคไต (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) คลินิกสูดดมหัวใจ/ไต (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) คลินิกทันตกรรม คลินิกสูดดมหัวใจ/ไต (ผู้ป่วยที่ 1) | คลินิกทันตกรรม, โสตศอนาสิกและโสตศอนาสิก คลินิกสูดดมหัวใจ/ไต (ผู้ป่วยที่ 1 และ 2) |

หมายเหตุ: คลินิกศัลยกรรมและโสตศอนาสิก - ผู้ป่วย 08.30 - 16.30 น.
 คลินิกทันตกรรมและโสตศอนาสิก - ผู้ป่วย 08.30 - 16.30 น.
 คลินิกสูดดมหัวใจและไต - ผู้ป่วยทุกวัน 08.30 - 16.30 น.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค
โรงพยาบาลตะโหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลตะโหมด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตะโหมด

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : MOIT ๒ ข้อ ๑๔ คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน

Link ภายนอก : <http://.tamohospital.com/>

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล



(นางวันดี ชนะสิทธิ์)

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายกิตติศักดิ์ ชูชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖